uenitur. quod duplicis loco abundantię sit partalis sit ut in medio ates diui

ɔ secari q. di non possit. LATITUDO

I	II	IIII	VIII	XVI	XXXII
	III	VI	XII	XXIIII	XLVIII
		VIIII	XVIII	XXXVI	LXXII
			XXVII	LIIII	CVIII
				LXXXI	CLXII
					CCXLIII

AN GU LA R ES

SES QUAL TE R I

Ultimi numeri s. III. IIII. et reliqui angulares quantum recedunt ab uno quolibet duplici sequo crescunt. quantum ipse duplus distat abundantiae

Inde contingit etiam in triplicibus ex illis enim sesquitertii perficiuntur. Nam quoniam primus triplex est ternarius numerus habet unum sesquitertium id est IIII cuius quaternarii tertia pars non potest inueniri. atque ideo hic epitrito caret. sed suum qui est VIII habet ad se duodenarium numerum sesquitertium. duodenarius autem quoniam habet tertiam partem in sesquitertia proportione comparatur ad eum numerum XVI qui tertiae partis sectione solutus est. XXVII autem quoniam tertiam se triplex habet ad se sesquitertium XXXVI et hic rursus ad XLVIII. eadem proportione comparatur. Cui si LXIIII appositi fuerint. eandem rursus sui proportionis explebunt. Quos LXIIII ad nullum sesquitertium rursus aptabis quoniam partem tertiam non tenent. Atque hoc in cunctis triplicibus inuenitur. ut excrescemus eiusdem proportionis numerus tantos ante se precedentes habeat. quantos primus eorum abundantiae discesserit et quotiens tot sub se eiusdem proportionis habuerit numeros quot abundantiae primus eorum iacet. cuius pars qua illi comparatur numerus possit eandem facere proportionem inueniri nequeat. Et ex pli cisque de haec descriptio LATITUDO

I	III	VIIII	XXVII	LXXXI	CC XLIII
	IIII	XII	XXX VI	C VIII	CCC XXIIII
		XVI	XLVIII	CXLIIII	CCCCXXXII
			L X IIII	C XCII	D LXXVI
				CC LVI	DCC LXVIII
					Ī XXIIII

AN GU LA R ES