



untq; ei indicia procedere curatio potest ad scalpellū aduersionē. Siptul. irritatū ē. sciasia
 carcinomia ēē. remouendaq; s; omnia aca r uehemētia. S; si sine ulcē n' loc' durus ē. impo
 mificū quāpingūmā aut r ipodes empt sāt ē. S; ule equalē ē. cerotū ex rōla imciat. Adiciatq;
 ei puluis ex comita testa. ex q; sāt ferrariū tange candidissimū ferrū solit ē. Sudnumū s;
 pereunt. remptanda squama erisē. q; lenissima ex aduersionib; ē. exten ne qd eminere patiat.
 S; na si nich exacēbabit. Summ. eodē ceroto etenti debent ēē. S; empt archistrati ad cunctos
 ulceratos fac usq; ad pfectionē. S; adipis porcini recentis t. i. t. ii. cerulle. x. vi. cere. thu
 ris. x. viii. rodim. x. vi. ouoz. leechi. iii. ponfolingon. x. i. lacal mōlieris. x. i.
 licet as ilac r ponfoligi simit terunt. **De chioma praxagoras.**
Cle qu dr chioma r pte nascit. itē dū dū ex alia causa facta siquunt. color el t lūidus ut
 niger. odor fetidus multū. r muc ei simit humor. ipsū ulc' neq; tactū neq; mechanitū
 sentit. prugine tamū mouens. acrima dolor ē. inflāmatiō. mēdū ē sāt oritur. nūquā
 exulor sanguis erumpit. nū qd malū serpit. q; oia sepe intendunt. fūq; exul ulc' q; fagedon
 gēi dū. q; celerit serpendo penetrandoq; ossa. com. uir. 71. 1. 1. 1.